

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ**  
(ΜΕΛΕΤΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ)  
**HELLENIC  
SOCIETY OF ALGOLOGY**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ IASP & EFIC  
GREEK CHAPTER OF IASP & EFIC

**25 Μαΐου 2022**

Αριθ. Πρωτ. 1210

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Πρόεδρος**  
Κ. ΒΑΓΔΑΤΛΗ

**Αντιπρόεδρος**  
Κ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ

**Γεν. Γραμματέας**  
Α. ΚΟΛΟΤΟΥΡΑ

**Ταμίας**  
Ε. ΧΡΟΝΑ

**Μέλη:**  
Ε. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ  
Μ. ΚΥΡΙΤΣΑ  
Α. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ

**Σύμβουλος στην EFIC**  
Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

**EXECUTIVE BOARD**

**President**  
Κ. VAGDATLI

**Vice President**  
Κ. ΚΟΚΚΙΝΙΣ

**Secretary General**  
Α. ΚΟΛΟΤΟΥΡΑ

**Treasurer**  
Ε. CHRONA

**Members**  
Ε. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ  
Μ. ΚΥΡΙΤΣΑ  
Α. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ

**Councilor to the EFIC**  
Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

**Αίτημα**

της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας  
της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας

**Προς:**  
**Κοινοποίηση:**

Υπουργό Υγείας κ. Α. Πλεύρη,  
Δ/ση Φαρμάκων και Φαρμακείων,  
Τμήμα Ναρκωτικών, κ. Α. Παππά  
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας κ. Ειρ. Αγαπηδάκη

**Θέμα:**

Προβλήματα στη διάθεση της από του στόματος μορφίνης  
άμεσης απελευθέρωσης 2% (Oramorph).

**Αξιότιμε κε Υπουργέ,**

Η μορφίνη άμεσης απελευθέρωσης από του στόματος χορηγούμενη, έχει ένδειξη παγκοσμίως για την αντιμετώπιση του οξέος και χρόνιου πόνου, καλοήθους και κακοήθους αιτιολογίας και αποτελεί φάρμακο πρώτης γραμμής, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των εταιρειών EFIC, EAPAC, ESMO αλλά και σύμφωνα με αναρίθμητο αριθμό μελετών<sup>1-5</sup>. Αποτελεί πολύτιμο φάρμακο στην φαρέτρα μας καθώς βοηθάει στην εύκολη και γρήγορη διαχείριση του έντονου παροξυσμικού πόνου κακοήθους αιτιολογίας όπως και στην πιλοποίηση των αναγκών των ασθενών με χρόνια πόνο σε οπιοειδή.

Επιπλέον μπορεί να χορηγηθεί τόσο σε παιδιατρικούς ασθενείς (για τους οποίους μάλιστα αποτελεί και το μοναδικό εγκεκριμένο οπιοειδές) όσο και σε ενήλικες εξασθενημένους, με προβλήματα στην κατάποση και δύσπνοια.

Η μορφή αυτή της μορφίνης επί του παρόντος έχει ενταχθεί στις διατάξεις περί κρατικού μονοπωλίου με αποτέλεσμα η διάθεσή της να γίνεται από συγκεκριμένα φαρμακεία και μόνο σε ορισμένες πόλεις σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο) με αποτέλεσμα μεγάλη δυσκολία στην παραλαβή. Η διαδικασία αυτή καθώς και η μη επιτρεπόμενη αποζημίωση του σκευάσματος από τα ταμεία προκαλεί μεγάλη δυσχέρεια στη διάθεση του φαρμάκου και στην πρόσβαση των ασθενών στην θεραπεία τους.

Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή το από του στόματος διάλυμα μορφίνης άμεσης απελευθέρωσης 2% είναι το μοναδικό σκεύασμα αυτής της μορφής που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη οι ασθενείς να το προμηθεύονται από το φαρμακείο της περιοχής τους και να αποζημιώνεται πλήρως, ειδικά για τους ασθενείς με κακοήθη πόνο νεοπλασματικής αιτιολογίας.

Να σημειώσουμε ότι η φεντανύλη που διατίθεται στα φαρμακεία είναι εκατό φορές ισχυρότερο οπιοειδές από τη μορφίνη και εξόχως πιο εθιστικό, παρόλα αυτά δεν είχαμε προβλήματα διάθεσης λόγω της σωστής συνταγογράφησης επί ενδείξεων και της συνεχούς επιτήρησης των ασθενών από τον θεράποντα ιατρό. Θεωρούμε ότι ο κίνδυνος από τη διάθεση της μορφίνης σε σχέση με τη διάθεση της φεντανύλης είναι σημαντικά μικρότερος εφόσον ακολουθούνται για τη συνταγογράφηση της οι οδηγίες όπως ορίστηκαν από τον νόμο 4737/2020-ΦΕΚ 204/Α/22-10-2020, άρθρο 21<sup>6</sup>.

Προτείνουμε η συγκεκριμένη μορφή άμεσης απελευθέρωσης από του στόματος χορηγούμενης μορφίνης να απαλλαγεί από τις διατάξεις του κρατικού μονοπωλίου ώστε να διευκολυνθεί η προμήθειά του από τα φαρμακεία.

Εναλλακτικά προτείνουμε να ακολουθείται για την διάθεση του συγκεκριμένου σκευάσματος, η διαδικασία η οποία ακολουθείται και για τα άλλα σκευάσματα οπιοειδών που χορηγούνται για την αντιμετώπιση χρόνιου σταθερού ή παροξυσμικού πόνου κακοήθους αιτιολογίας.

Ακόμη παρακαλούμε για πρόβλεψη των αναγκών και ύπαρξη αποθεμάτων ώστε να διευκολύνεται η εξυπηρέτηση των απαιτήσεων.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας έτσι ώστε οι ασθενείς που είναι ταλαιπωρημένοι από τον πόνο της ασθένειάς τους να διευκολυνθούν στην προμήθεια της μορφίνης και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους ασθενείς ανά τον κόσμο.

#### Βιβλιογραφία

1. Bennett MI, Eisenberg E, Ahmedzai SH, Bhaskar A, O'Brien T, Mercadante S, Krčevski Škvarč N, Vissers K, Wirz S, Wells C, Morlion B. Standards for the management of cancer-related pain across Europe-A position paper from the EFIC Task Force on Cancer Pain. Eur J Pain. 2019;23(4):660-668. doi: 10.1002/ejp.1346. Epub 2019 Jan 6. PMID: 30480345; PMCID: PMC7027571.
2. Caraceni A, Hanks G, Kaasa S, Bennett MI, Brunelli C, Cherny N, Dale O, De Conno F, Fallon M, Hanna M, Haugen DF, Juhl G, King S, Klepstad P, Laugsand EA, Maltoni M, Mercadante S, Nabal M, Pigni A, Radbruch L, Reid C, Sjogren P, Stone PC, Tassinari D, Zeppetella G; European Palliative Care Research Collaborative (EPCRC); European Association for Palliative Care (EAPC). Use of opioid analgesics in the treatment of cancer pain: evidence-based recommendations from the EAPC. Lancet Oncol. 2012;13(2):e58-68. doi: 10.1016/S1470-2045(12)70040-2.
3. Fallon M, Giusti R, Aielli F, Hoskin P, Rolke R, Sharma M, Ripamonti CI; ESMO Guidelines Committee. Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol. 2018 Oct 1;29(Suppl 4):iv166-iv191. doi: 10.1093/annonc/mdy152. PMID: 30052758
4. WHO Guidelines for the Pharmacological and Radiotherapeutic Management of Cancer Pain in Adults and Adolescents. Geneva: World Health Organization; 2018. PMID: 30776210.
5. Wiffen PJ, Wee B, Moore RA. Oral morphine for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Apr 22;4(4):CD003868. doi: 10.1002/14651858.CD003868.pub4. PMID: 27105021; PMCID: PMC6540940.
- 6, <https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/nomos-4737-2020-phek-204a-22-10-2020.html>


**Με εκτίμηση  
Για το Δ.Σ.**

**Η Πρόεδρος της ΕΕΑ**



**Κυριακή Βαγδατλή**

**Η Πρόεδρος της ΕΑΕ**



**Αννα Μαλισιώβα**